

経口抗ウイルス薬とは？



COVID-19 の患者に投与する飲み薬が改良されました。

COVID-19 が重症化する危険があり、過去 5 日以内に受けた COVID-19 の検査が陽性だった場合、経口抗ウイルス薬の処方してもらったことをご検討ください。2 種類の治療薬があります：Pfizer 社の [Paxlovid™](#) と Merck 社の [legevirio](#) です。年齢、既往歴、症状が出ている日数によって、これらの COVID-19 の治療薬の対象になる可能性があります。

経口抗ウイルス薬は、SARS-CoV-2 ウイルス（COVID-19 の原因となるウイルス）が体の中で増殖することを防ぎ、体内のウイルス量を減らし、免疫システムを助けることで、体が COVID-19 と闘うのを助けます。この治療により、症状の軽減と、病気が重症化して病院での治療が必要になる可能性を減らすことができます。

• どのように経口抗ウイルス薬を服用しますか？

経口抗ウイルス薬を服用するという事は、錠剤を飲むということになります。かかりつけの医療機関の指示に従って、経口抗ウイルス薬を服用してください。1 回分を空けたり、服用を忘れてしまったからといって余計な分量を摂取することはしないでください。全ての内服薬が無くなるまで、または、かかりつけの医療機関による停止の指示がある時点まで服用してください。経口抗ウイルス薬は食べ物と一緒に服用でも、そうでなくても構いませんが、錠剤は壊したり潰したりせずにそのまま飲み込むことが推奨されています。


• 腎臓や肝臓等に基礎疾患がある場合はどうすればいいですか？

薬の服用を始める前に、かかりつけの医療機関と既往歴について話し合ってください。これは、今までの健康状態、処方薬、市販薬、ビタミン剤やその他サプリメントなど、現在摂取しているものについて話すことも含まれます。

腎臓や肝臓に疾患のある方は、経口抗ウイルス薬を服用する前に、かかりつけの医療機関にご相談ください。かかりつけの医療機関が経口抗ウイルス薬の服用がふさわしいか、そして分量が適しているかを判断します。特定の状態にある人には推奨されない治療もあります。

- 経口抗ウイルス薬の対象に該当しない場合はどうすればいいですか？

経口抗ウイルス薬の服用が適格ではない、またはふさわしくないかは、かかりつけの医療機関が判断します。いくつかの理由がある場合があります。全ての該当条件に見合っていない、又はあなたの健康状態が特定の治療にふさわしくない場合もあります。かかりつけの医療機関と最適な治療方法を話し合ってください。



DOH 825-029 May 2022 Japanese

本資料を別の形式で入手したい場合は、1-800-525-0127 までお電話ください。聴覚障害のある方は、711 (Washington Relay) にお電話いただくか、またはEメールで <mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov> までご連絡ください。