

ሄፓታይተስ ቢ ምንድን ነው?

ሄፓታይተስ ቢ ጉበትን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው። ሳይታከም ከቆየ፣ የጉበት መጎዳትን እና ካንሰርን ሊያስከትል ይችላል።

በአለም አቀፍ ደረጃ በግምት እስከ 296 ሚሊዮን ሰዎች ከሄፓታይተስ ቢ ጋር እየኖሩ ነው። አብዛኞቹ ይህን አይውቁም ምክንያቱም ህመም አይሰማቸውም ወይም የታመሙ አይመስሉም።

ሄፓታይተስ ቢ በተበከለ ደም ወይም በተወሰኑ የሰውነት ፈሳሾች ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል።

ሄፓታይተስ ቢ እና እርግዘና

ነፍሰ ጡር ከሆኑ፣ እንደ ቅድመ ወሊድ እንክብካቤ አንዱ ክፍል የሄፓታይተስ ቢ የደም ምርመራ ማድረግ አለብዎት።

በበሽታው ከተያዙ ሄፓታይተስ ቢ ን በወሊድ ወቅት አዲስ ወደተወለደው ልጅ ሊያስተላልፉ ይችላሉ።

ነፍሰጡር ከሆኑ እና ሄፓታይተስ ቢ ካሉብዎት፣ ኢንፌክሽኑን ለመከላከል ልጅዎ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ የተወሰኑ ክትባቶችን ማድረግ ይችላል።



ለበለጠ መረጃ፦

Centers for Disease Control and Prevention (CDC፣ የበሽታ መቆጣጠር እና መከላከል ማዕከላት) www.cdc.gov/hepatitis/hbv/

ሄፓታይተስ ቢ እናቶች www.hepbmoms.org (እንግሊዘኛ)



DOH 420-406 May 2022 Amharic
ይህን ሰነድ በሌላ ቅርጸት ለመጠየቅ፣ በ 1-800-525-0127 ይደውሉ።
መስማት የተሳናቸው ወይም የመስማት እክል ያለባቸው ደንበኞች፣
እባክዎ 711 (Washington Relay) ላይ ይደውሉ ወይም በ
civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ያድርጉ።
ምንጭ፦ CDC, Protect Your Baby for Life

ሄፓታይተስ ቢ፦
ራስዎን እና ልጅዎን
ለመጠበቅ ማወቅ
ያለብዎት ነገር





ልጅዎን ይጠብቁ እና ሄገታይተስ ቢ ን ይከላከሉ

ልጅዎ በተወለደ በ 24 ሰአታት ውስጥ የመጀመሪያውን የሄገታይተስ ቢ ክትባት ማግኘት አለበት።

ሄገታይተስ ቢ ፖዘቲቭ ከሆነ፣ ልጅዎ በተወለደ በ 12 ሰአታት ውስጥ የ ሄገታይተስ ቢ ኢሚውን ግሎቡሊን (HBIG) ማግኘት አለበት።

ልጅዎን ከሄገታይተስ ቢ ለመጠበቅ 3 የሄገታይተስ ቢ ክትባቶች እና የ HBIG ክትባት ያስፈልጋቸዋል። ልጅዎ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ ከ 9-12 ወራት ልጅዎ እንዲመረመር ያድርጉ።

ቀን	ሄገታይተስ ቢ ካለባት ሴት የተወለደ ጨቅላ ህጻን መውሰድ ያለባቸው
በወሊድ ጊዜ	የሄገታይተስ ቢ የወሊድ ክትባት እና ኢሚውን ግሎቡሊን (HBIG)
1-2 ወራት	2ኛ የሄገታይተስ ቢ ክትባት ዶዝ
6 ወራት	3ኛ የሄገታይተስ ቢ ክትባት ዶዝ
9-12 ወራት	ልጅዎ እንደተጠበቀ ለማረጋገጥ ይመርመሩ

ልጅዎን የሚጠብቁበት ሌሎች መንገዶች እነዚህ ናቸው፡-

- ሄገታይተስ ቢ ኖሮብዎትም ልጅዎን ጡት ማጥባት ይችላሉ። መሰንጠቅ ወይም የጡት ጫፎች መድማት ካጋጠሙዎት ሃኪምዎን ያነጋግሩ፣ ጡት በሚያጠቡበት ጊዜ የሚረዱዎት ሌሎች አማራጮች አሉ።
- የሄገታይተስ ቢ ክትባት መዘገብዎን ይያዙ እና ወደ ህክምና ጉብኝትዎ ይዘውት ይምጡ።
- የቤተሰብ አባሎችዎ የሄገታይተስ ቢ ምርመራ እንዲያደርጉ እና እንዲከተቡ ያድርጉ።

ሄገታይተስ ቢ ከሌላብዎት

አሁንም ቢሆን ራስዎን እና ልጅዎን በአስተማማኝ እና ውጤታማ ክትባት መጠበቅ ይችላሉ። ክትትሉም ማጠናቀቅዎን ያረጋግጡ!

ቀን	ጨቅላ ህጻናት መውሰድ ያለባቸው
በወሊድ ጊዜ	የሄገታይተስ ቢ የወሊድ ክትባት
1-2 ወራት	2ኛ የሄገታይተስ ቢ ክትባት
6 ወራት	3ኛ የሄገታይተስ ቢ ክትባት

ሄገታይተስ ቢ ካለብዎት ራስዎን ይጠብቁ

የጉበትዎን ጤና ለመፈተሽ እና ህክምና እንደሚያስፈልግዎት ለማየት ተጨማሪ ምርመራዎች ሊያስፈሉዎት ይችላል።

አንቲቫይራል የሚባሉት መድሃኒቶች፣ ሄገታይተስ ቢ ያለባቸውን ብዙ ሰዎች ያክማሉ። ይሁን እንጂ፣ ህክምና የሚያስፈልገው ሁሉም ሰው አይደለም።

ማንኛውም አይነት የመድሃኒት ትዕዛዝ፣ ማሟያዎች፣ ወይም ቫይታሚኖች ከመውሰድዎ በፊት ሃኪም ይጠይቁ ምክንያቱም አንዳንድ መድሃኒቶች ጉበትን ሊጎዱ ይችላሉ።

እንዲሁም ከሄገታይተስ ኤ ክትባት ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኢንፎክሽንዎን ለመቆጣጠር ከወለዱ በኋላ ሃኪምዎን ማግኘትዎን ይቀጥሉ።

ሄገታይተስ ቢ ለልጄ አደገኛ ነው?

ልጆች በሄገታይተስ ቢ ሲያዙ፣ የእድሜ ልዩ፣ ስር የሰደደ ኢንፌክሽን የመያዝ እድላቸው 90% ያህል ነው።

ሳይታከም ከቀረ፣ ስር የሰደደ ሄገታይተስ ቢ ካለባቸው 4 ልጆች 1 እንደ የጉበት መጎዳት፣ ይጉበት በሽታ፣ ወይም የጉበት ካንሰር ያሉ አደገኛ የጉበት ችግሮች ይይዘዋል።

እንደ እድል ሆኖ፣ የሄገታይተስ ቢ ኢንፌክሽንን በጣም አስተማማኝ እና ውጤታማ በሆነ ክትባት መከላከል ይቻላል።